

Itraconazol



Marca comercial: Sporanox

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El itraconazol, conocido también como Sporanox, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicóticos. Estos productos se usan para tratar las infecciones micóticas graves que pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Suelen presentarse con más frecuencia en pacientes con inmunodeficiencia, incluso en los infectados por el VIH.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El itraconazol fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 11 de septiembre de 1992 para el tratamiento de adultos con infección simultánea por el VIH y *Penicillium marneffei*. También está autorizado para uso como agente sustitutivo para el tratamiento o la supresión continua de la meningitis criptocócica en pacientes con SIDA y otras afecciones causantes de inmunodeficiencia.

Presentación/Administración

Se fabrica en cápsulas y solución para administración oral y en solución para inyección intravenosa.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el itraconazol puede causar algunos efectos adversos. Entre ellos cabe citar fiebre y escalofrío; erupción cutánea o picazón; dolor de garganta; enrojecimiento, formación de ampollas, descamación o desprendimiento de la piel y las membranas mucosas; coloración oscura o ámbar de la orina; inapetencia; deposiciones pálidas; dolor de estómago; cansancio o debilidad poco comunes; amarillamiento de los ojos o la piel; y hemorragia o hematomas poco comunes. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de algunos de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos cabe citar mareo; somnolencia; dolor de cabeza; dolor abdominal; estreñimiento; diarrea; náusea; y vómito. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de

venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian itraconazol, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba itraconazol. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Itraconazole AND HIV infections.

Fabricantes

Sporanox
Ortho Biotech
P.O. Box 6914
430 Rt. 22 East
Bridgewater, NJ 08807-0914
(800) 682-6532

Itraconazole
Janssen Pharmaceutica Inc
1125 Trenton-Harbourton Rd / PO Box 200
Titusville, NJ 08560-0200
(800) 526-7736

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este